

## **Allegato n.1**

### **Elenco delle sostanze e volumi minimi di campione richiesti.**

#### **1. Analiti determinati in sangue**

Alcool etilico, amfetamina/metamfetamina/MDMA, barbiturici, benzodiazepine, buprenorfina, cannabinoidi, cocainici, metadone, oppiacei, fenciclidina, antidepressivi triciclici, fentanil, ketamina, LSD, metaqualone, ossicodoni, propoxifene.

#### **2. Analiti determinati in siero**

Transferrina Carboidrato Carente (CDT, indicatore di uso abituale di alcool).

#### **3. Analiti determinati in urina**

- amfetamina/metamfetamina/MDMA, buprenorfina, cannabinoidi, cocainici, metadone, oppiacei, barbiturici, benzodiazepine, fenciclidina, antidepressivi triciclici.
- Ciclofosfamide, ifosfamide, doxorubicina, epirubicina

Per tutti gli analiti indicati ai punti 1 e 3, è necessaria n. 1 provetta con almeno 6 mL di campione.

Per la determinazione della CDT, di cui al punto 2, è necessaria n. 1 provetta con almeno 1 mL di siero. Si specifica che, qualora presso il D.A.I. richiedente non sia possibile procedere alla centrifugazione del campione ematico, lo stesso dovrà essere consegnato al Laboratorio entro le 4 ore dal prelievo.