



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute e  
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

*Il Direttore Generale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0183468 15/03/2016 15,21

Mitt. : 5204 Direzione Generale tutela salu...

Dest. : COMMISSARI STRAORDINARI AA.SS.LL. E AA.OO.

Classifica : 52.4. Fascicolo : 144 del 2016



*Ai Commissari Straordinari  
delle ASL e delle AORN  
Ai Presidenti degli Ordini dei Medici  
Ai Presidenti dei Collegi delle Ostetriche  
Regione Campania  
LORO SEDI*

*Oggetto: Segnalazione outbreak da Zika Virus: Nota dell'ISS, Centro Nazionale Trapianti.*

*Ad integrazione della Circolare del Ministero della Salute di analogo oggetto, già inviata, legato si trasmette per conoscenza ed applicazione la nota prot. n. 394/CNT2016, richiamando l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una diffusa informazione all'utenza ed agli operatori, anche a mezzo dei siti web aziendali.*

dr.ssa A Guida

*Il Direttore Generale  
Avv. Antonio Postiglione*



MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Trapianti*

*Guerra*

12 febbraio 2016

*Roma*

Prot. 394/CNT2016



WHO Collaborating Centre  
On Vigilance and Surveillance for  
Human Cells, Tissues and Organs

Assessorati alla Sanità

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nitp

DIT Dipartimento Interaziendale Trapianti  
Regione Campania

IBMDR

GITMO

Dott. Ranieri Guerra  
Direttore Generale  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini  
Direttore Ufficio VIII- ex DGPREV  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Grazia Pompa  
Direttore Ufficio V  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della  
Salute

Dott.ssa Serena Battilomo  
Direttore Ufficio X - Salute della donna e dell'età evolutiva  
Direzione generale della prevenzione - Ministero della Salute

e p.c. Prof. Walter Gualtierio Ricciardi  
Presidente - Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma  
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045  
Fax. +39 06/4990.4101  
e-mail: ent@iss.it - PEC: ent@pec.iss.it

[www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it)

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno  
Direttore Centro Nazionale Sangue -Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Angela Teresa Maria Spinelli  
Direttore f.f. Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e  
Promozione della Salute  
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Silvia Declich  
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e  
Promozione della Salute  
Istituto Superiore di Sanità

Ai Referenti Regionali Procreazione Medicalmente assistita

**Oggetto: Segnalazione outbreak da Zika virus**

Gentilissimi,

si trasmettono per opportuna conoscenza gli aggiornamenti forniti dall'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e dalla Pan American Health Organization (PAHO) relativi a recenti casi di infezione da Zika virus nell'isola di Curaçao, in Giamaica e in Costa Rica. In aggiunta, l'ECDC segnala il riscontro di casi autoctoni nelle isole Maldive nel corso del 2015, oltre a quelli già segnalati in molti altri paesi (Brasile, Colombia, Suriname, Guatemala, El Salvador, Indonesia -Isola di Sulawesi, Capo Verde, Messico, Panama, Paraguay, Venezuela, Honduras, Guyana Francese, Martinica, Porto Rico, Guyana, Haiti, Saint Martin, Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadalupa, Repubblica Dominicana, Thailandia, Isole del Pacifico, Isole Vergini Americane, Isole del Pacifico).

L'infezione da virus Zika è asintomatica nella maggior parte dei pazienti. Sintomi più comuni sono rappresentati da febbre, eruzione cutanea, artromialgie, congiuntivite e cefalea. Il periodo di incubazione è da pochi giorni a una settimana e i sintomi tipicamente si risolvono nell'arco di una settimana. Manifestazioni cliniche e/o decessi sembrano essere eccezionali.

Al momento non risultano riportati casi di trasmissione di infezione da Zika virus con il trapianto di organi, pertanto si rappresenta che, in caso di comparsa nei riceventi di organi, di una sintomatologia clinica non diversamente identificabile, venga valutata la possibilità della trasmissione di tale virus, qualora il donatore presenti anamnesi positiva per viaggi nelle aree sopra indicate. Per tanto si raccomanda, vista l'ampia diffusione dei due potenziali vettori (*Aedes Aegypti*, *Aedes Albopictus*), di **rafforzare la sorveglianza anamnestica del donatore per i viaggi nelle aree interessate**.

In questi casi, i Coordinatori dei Centri Regionali e Interregionali Trapianto sono invitati a contattare tempestivamente la second opinion infettivologia ed il CNTO.

La sorveglianza anamnestica per i viaggi deve essere rafforzata anche per i **donatori di sperma**. Gli Istituti dei tessuti di PMA dovranno **sospendere il prelievo di sperma da donatori omologhi e eterologhi durante i 28 giorni successivi al ritorno da zone in cui è segnalata la diffusione del virus**, dal momento che è stata rilevata la presenza di virus vitale nel seme per più di due settimane dopo la guarigione da infezione da virus Zika.

Per quanto riguarda i tessuti invece, si raccomanda di non effettuare il prelievo da donatori che abbiano soggiornato in una delle aree sopraindicate nei 28 giorni precedenti.

L'importazione di tessuti e cellule dalle aree affette potrà essere autorizzata solo in caso di negatività del test NAT per Zika virus sui donatori o di utilizzo di metodiche validate di inattivazione/sterilizzazione

La lista aggiornata dei paesi e aree interessate dalla diffusione del virus Zika è reperibile al seguente link:

[http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika\\_virus\\_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx](http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx)

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

[http://ecdc.europa.eu/en/press/news/\\_layouts/forms/News\\_DispForm.aspx?ID=1351&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-](http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1351&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx)

[18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx](http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1351&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx)

[http://www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=en](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=en)

<https://www.myast.org/optnunos-guidance-zika-transmission>

Il direttore del Centro Nazionale Trapianti  
Dott. Alessandro Nanni Costa

