Assessorati alla Sanità

Referenti Regionali Procreazione Medicalmente Assistita

Centri Procreazione Medicalmente Assistita

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nitp

DIT Dipartimento Interaziendale Trapianti
Regione Campania

Dott. Ranieri Guerra
Direttore Generale
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore Ufficio VII
Trapianti, sangue ed emocomponenti
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

Dott. Francesco Paolo Maraglino
Direttore Ufficio V - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

Dott.ssa Serena Battilomo
Direttore Ufficio IX - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze
Direzione generale della prevenzione - Ministero della Salute

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4043
Fax. +39 06/4990.4101
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

www.trapianti.salute.gov.it

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno
Direttore Centro Nazionale Sangue
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Angela Teresa Maria Spinelli
Direttore f.f. Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Silvia Declich
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità

Oggetto: Segnalazione outbreak da Zika virus – precisazioni in merito ai donatori di cellule riproduttive.

Gentilissimi,

Ad integrazione di quanto riportato nelle precedenti note sullo stesso argomento inviate, si precisa quanto segue per le donazioni di cellule riproduttive.

Per quanto riguarda le donatrici omologhe ed eterologhe di **gameti e tessuto ovarico femminili**, in caso di diagnosi di infezione da Zika virus, il prelievo potrà essere effettuato trascorsi **28 giorni** dalla cessazione dei sintomi.
Per quanto riguarda le pazienti asintomatiche che abbiano soggiornato in una delle aree indicate nella lista dell'ECDC, si raccomanda di sospendere il prelievo di gameti femminili per 28 giorni dopo il ritorno dall'area affetta.

Donatrici che abbiano avuto contatti sessuali con un uomo a cui è stata diagnosticata l'infezione da virus Zika o con un uomo che ha viaggiato in una delle aree affette nei sei mesi precedenti al contatto sessuale possono donare/raccogliere gameti femminili dopo almeno 28 giorni dall'ultimo contatto sessuale.

La sorveglianza anamnestica per i viaggi deve essere rafforzata in particolare per i **donatori di sperma.**
I Centri di PMA/Banche del seme dovranno sospendere la raccolta di sperma da donatori omologhi e eterologhi, in caso di diagnosi di infezione da Zika virus, per **i sei mesi successivi** dalla cessazione dei sintomi.
, Per quanto riguarda i pazienti asintomatici che abbiano soggiornato in una delle aree indicate nella lista dell'ECDC, i Centri di PMA/Banche del seme dovranno sospendere la raccolta di

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Tel +39 06 4990 4040 - 4041 - 4045
Fax. +39 06 4990 4100
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

www.trapianti.salute.gov.it

rischio per infezione da Zika virus.

La lista aggiornata dei paesi e aree interessate dalla diffusione del virus Zika è reperibile al seguente link:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-withtransmission.aspx

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica.

Nel sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control sono disponibili ulteriori informazioni riguardo al rischio legato all'infezione da virus Zika, comprese le raccomandazioni per le donne in gravidanza o che intendono avere una gravidanza.
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1351&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx

Ulteriori notizie sono disponibili al seguente link:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=en
https://www.myast.org/optnunos-guidance-zika-transmission

Si prega le autorità competenti regionali di dare la massima e tempestiva diffusione della presente nota ai propri Centri PMA.

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Dott. Alessandro Nanni Costa

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045
Fax. +39 06/4990.4101
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

www.trapianti.salute.gov.it